

RECOLECCIÓN DE MUESTRA PARA COPROCULTIVO

Su médico le ha indicado un examen en el que debe recolectar muestra de deposición, para ello es necesario que siga las siguientes indicaciones. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

Requisitos:

Se sugiere no estar en terapia con antibióticos ni consumiendo laxantes, en caso contrario informar a personal técnico paramédico que recibirá la muestra.

Recolección de la muestra:

1. La muestra será obtenida mediante hisopado rectal, introduciendo torula estéril por el esfínter anal. Si no es posible obtenerla mediante esta técnica de recolección, se deberá proceder como se describe en los puntos 2, 3 y 4.
2. Se le proporcionará a usted un frasco estéril de boca ancha. No abrir el material entregado hasta el momento de tomar la muestra
3. Defeque en un recipiente limpio y seco, evitando contaminar con orina
4. Cierre el contenedor ajustando la tapa herméticamente e introduzca frasco en una bolsa para trasladar al laboratorio.

Si el paciente utiliza pañal siga las siguientes instrucciones:

La muestra puede ser tomada desde el pañal procurando evitar la mezcla con orina o jabón, de lo contrario, será obtenida mediante hisopado rectal.

Traslado de la muestra:

Si la muestra fue obtenida mediante deposición, lleve el tubo a la unidad de toma de muestras en un plazo no mayor a 2 horas.

Mantenga la muestra a temperatura ambiente, NO REFRIGERAR.

Plazo entrega de resultado:

Una vez recepcionada la muestra, el resultado se encontrará disponible en un plazo de 3 días Hábiles.